

Noteringen

Svin

Basisnotering (70,0-94,9) uge 26: 10,20 kr.

Friland A/S giver i uge 26 følgende tillæg til konventionel notering: Øko-tillæg (alle grise): 4,00 kr./kg. Kvalitetstillæg (godkendte grise): 3,00 kr./kg. Ud over á conto udbetalingen ydes økologisk markedstillæg afhængigt af afsætningsituationen - for uge 26: 14,50 kr./kg for alle grise. Søer (slægtes ca. hver 3. uge) 14,00 kr./kg. Der udbetales også konventionel efterbetaling fra Danish Crown.

Smågrise

Vejledende notering fra Viden-center for Svineproduktion for økologiske smågrise for uge 24: Beregnet smågrisenotering: 30 kg: 1.100,53 kr. (0). Kg-regulering: 12-25 kg: 17,57 kr. 25-30 kg: 16,57 kr. 30-40 kg: 17,93 kr. Noteringen tager udgangspunkt i basisnoteringen fra Friland A/S og er inklusive efterbetaling.

Kvæg

Friland A/S giver følgende merpriser for økologisk kvæg leveret i uge 26: Kalve u/12 mdr.: 4,75 kr./kg. Kvier og stude: Variabelt tillæg 11,50 kr./kg, kontrakttillæg 4,00 kr./kg. Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form > 3,5: 7,75 kr./kg. Ikke-kvalitetsgodkendte kvier og stude form < 3,5: 8,50 kr./kg. Køer og tyre > 24 mdr: 8,50 kr./kg. DB køer, kontrakttillæg: 1,00 kr. Ungtyre 12-24 mdr., variabelt tillæg: 5,00 kr./kg., kontrakttillæg: 2,50 kr./kg. Kvalitets-godkendte dyr på kontrakt aftegnes med variabelt tillæg + kontrakttillæg. Tillæggene gives til dyr, som overholder veldefinerede kvalitetskrav.

Tyrekalve

Vejledende notering på økologiske tyrekalve fra Brancheudvalget for Økologiske Køddproducenter: Jersey, (3. mdr., 65 kg). Pris: 1.362 kr. Kg-reg.: 9 kr. SDM, (3. mdr., 96 kg). Pris: 2.395 kr. Kg-reg.: 12 kr. Priserne er inkl. afhorning og studning.

Økologi & Erhverv tager forbehold for evt. fejl.



Få styr på jordlopperne

Rapsjordlopper er det værste skadedyr i økologisk vinterraps og en af de vigtige ting man skal have styr på for at få et ordentligt udbytte

VINTERRAPS

AF ANNA-CHRISTA BJERG

En strategi kan være at følge varslene for rapsjordlopper tæt og undlade at dyrke raps i år med højt varsel for rapsjordlopper. Erfaringsmæssigt er der højt varsel for rapsjordlopper hvert 6-7 år. Men der er masser af eksempler på, at dyrkning af økologisk vinterraps kan gå godt trods varsel om mange rapsjordlopper. Der er en lang række faktorer, man kan arbejde med, der kan holde rapsjordlopper nede og modvirke deres skadevirkninger, hvis man ønsker at dyrke raps, nu hvor prisen er høj. Foreløbige anbefalinger fra Projekt stabile udbytter i vinterraps blev præsenteret på en markvandring i juni på Stenalt Gods, baggrunden for anbefalingerne er rapsforsøg på flere forskellige lokaliteter, samt at man har fulgt og indsamlet erfaringer fra ti forskellige bedrifter med marker, der blev sået til med vinterraps i efteråret 2014.

En central udfordring

Diskussionen centrerede sig om rapsjordlopper, som er en af de cen-

trale udfordringer i økologisk dyrkning af vinterraps. Voksne rapsjordlopper hæmmer planternes vækst om efteråret, mens larverne ødelægger stængler og bladstilke i årets første måneder. Store og kraftige planter i god vækst er det vigtigste kriterium for, at en rapsmark kan overleve et angreb af rapsjordlopper og give et godt udbytte.

Derfor er sædskifte, sortsvalg, såtidspunkt, såbed og plantetal, næringsstofforsyning og ukrudtsbekæmpelse en del af skadedyrsforbyggelsen.

Anbefalinger

Kløvergræs er den bedste forfrugt til vinterraps, mens et fornuftigt sortsvalg kan være linjesorten Quartz, der kan etableres tidligt og er billig i ud-sæd, eller hybridsorter, f.eks. Carlo og Exclusiv, som har kraftig vækst og kan etableres med lavere udsædsmængde.

Altafgørende er et godt såbed og en rettidig såning senest 10. august alle andre steder end kystnære og varme område som smålandshavet, hvor man kan så lidt senere i august.

I økologisk vinterraps går man højere op i plantetal end ved dyrkning af konventionel raps for at sikre, at afgrøden kan konkurrere med ukrudtet og overskygge det. Diskussionen om det rette plantetal slutter aldrig. Til konventionelt dyrkede raps anbefaler man 36-38 planter/m², til økologiske raps går man højere op, nogen gange helt op til 50 eller 65 planter, men det høje plantetal giver

mindre planter, som er mere følsomme for angreb af rapsjordlopper. Her vil det være langt bedre med færre og kraftigere planter, fordi de ikke bliver så slemt angrebet af rapsjordlopper, og de påvirkes heller ikke så meget af angrebene. - 20 til 22 gode kraftige planter pr. kvm. er sådan set nok, fortalte planteavlser Poul Christensen.

- Hvis man sår på række og radrenser, kan man tillade sig at gå ned i plantetal supplerede specialkonsulent i økologi Lars Egelund Olsen. Med lavt ukrudtstryk og kløvergræs som forfrugt, kan man vælge en rækkeafstand på 12,5 cm, mens man ved et stort ukrudtstryk kan gå højre op indtil maksimalt 50 cm rækkeafstand.

En effektiv pløjning inden etablering og radrensning to-tre gange er den anbefalede behandling mod ukrudt. Hvis man ikke kan prioritere nok gødning til vinterrapsen, bør man dyrke en anden afgrøde, siger erfaringerne.

Andre strategier for bekæmpelse

Ud over at sikre store kraftige planter i god vækst, er der i forsøgene afprøvet forskellige andre strategier

for at lokke rapsjordlopperne andre steder hen eller afskrække dem, så de ikke vælger at slå sig ned på rapsplanterne. Det er f.eks. at så majroer sammen med raps for at lokke rapsjordlopperne væk eller lægge bånd af kalk ud tæt ved rapsplanterne, men man har indtil videre ikke fundet frem til nogen strategi med en sikker effekt.

Resolut omsåning ved angreb

Når man har valgt at så økologisk vinterraps, skal man tjekke sin økologiske vinterrapsmark for rapsjordlopper sidst i marts eller senest først i april. Det gøres ved at trække 15-20 planter op hen over marken, og skære stænglen over med et langt skråt snit og tælle de hvide larver.

Store kraftige planter kan klare sig og give et godt udbytte, selv om der er fem larver pr. plante, mens små spinkle planter måske bliver hårdt ramt allerede ved to larver pr. plante. Det er altså en vurdering, om marken er i stand til at give et ordentligt udbytte, og hvis planterne er hårdt angrebet af rapsjordlopper, er det vigtigt, at man tager en hurtig beslutning og sår en anden afgrøde i stedet.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne



Miljø- og Fødevareministeriet
NaturErhvervstyrelsen

LDP 2020



Den Europæiske Landbrugsfond
for Udvikling af Landdistrikterne