



Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne:
Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

DERFOR MANGLER LEVEREN



Dato _____

Fra CHR _____ er d.d.

_____ stk. levere kasseret pga. leverikter

Embedsdyrlægens navn

Underskrift/stempel

LEVERIKTER

Efter slagtningen af dine får/lam har slagteriets kontrollerende dyrlæge konstateret leverikter i dine får/lam. Derfor er leveren blevet kasseret.

Leverikter er et stigende problem i danske fårebesætninger. Infektion med leverikter giver nedsat tilvækst og utrivelighed hos de angrebne dyr. Leverikter kan ved svære infektioner forårsage dødsfald.

Leverikter lever, som navnet siger, i fårets lever. Leveriktens lidt komplicerede livscyklus kan ses i fig. 1. Parasitten optages på græs, hvorefter den vandrer fra dyrets tarmsystem til leverens galdegange. I leveren udvikler den sig til voksenstadie, og her begynder den at udskille æg, der udskilles med gødningen. For at ægget kan udvikle sig, kræver det, at den optages af en pytsnegl (Fig.2). Pytsneglen er mellemvært for parasitten. Pytsneglen lever i våde områder ved vandhuller og vandløb. Ca. 14 dage efter optagelse vil de første forandringer kunne ses.

Bedst er at undgå afgræsning af de vådområder, hvor sneglen findes. Hvis ikke dette er muligt, findes der et receptpligtigt lægemiddel, Valbazen, mod leverikter. Valbazen er et ormemiddel.

BEHANDLING

For at virke mod leverikter skal det gives i en dosis, der svarer til 1,5 af dosis mod orm. Desuden virker Valbazen kun mod voksne leverikter ældre end 12 uger. Dvs. at dette lægemiddel først virker på de leverikter, som fåret/lammet optog for mere end 12 uger siden. Valbazen bør ikke anvendes i bedækningssæsonen og den første måned af drægtigheden.

På dispensation fra Sundhedsstyrelsen (søges af den praktiserende dyrlæge) er det muligt at anvende nedenstående lægemidler mod leverikter:


Fasinex er det mest anvendte lægemiddel mod leverikter og er virksom over for leverikter ældre end en uge. Bør ikke anvendes i sidste tredjedel af drægtigheden. Flukiver er virksom over for leverikter ældre end 6 uger.

FIGUR 2



FIGUR I

LEVERIKTENS LIVSCYKLUS



- 1 Voksne leverikter i leveren lægger æg
- 2 Æg klækkes i vand
- 3 Unge leverikte optages af pytsnegle
- 4 Pytneglene lever i lavtsstående rindende vand
- 5 Unge leverikter forlader pytsnegl og sætter sig på græs
- 6 Græssende dyr æder græs med leverikter

LÆGEMIDDEL	VALBAZEN 1,9%	FASINEX 10%	FLUKIVER
VIRKNING PÅ IKTEROPTAGET	Mere end 12 uger siden	Mere end 1 uge siden	Mere end 6 uger siden
DOSIS	1 ml pr 4 kg	1ml pr 10 kg	1 ml pr 5 kg
PRIS	415 kr. pr liter	590 kr. pr 800 ml	523 kr. pr liter
PRIS FOR BEHAND. AF FÅR (75 KG)	7,78 kr.	5,53 kr.	7,85 kr.
SLAGTEFRIST	30 døgn	56 døgn	42 døgn
ØVRIGE BEMÆRKNINGER		Kræver dispensation	Kræver dispensation

Priser er oplyst juni 2015 og er eks moms

Udarbejdet af Inga Stamphøj
i samarbejde med Økologisk Landsforening

