

Raps

FRØ



Beskrivelse af varen

Frø af raps.

Sædskifte og dyrkning

Raps er en ustabil afgrøde på grund af høj risiko for skadedyrsangreb. Vinterraps har højere dyrkningssikkerhed end vårraps. Vårraps kan rammes hårdt af ny generation af glimmerbøsser. Der bør være mindst 3 - 4 år mellem raps i sædskiftet. Vinterraps klarer sig bedst på lerjord og er mindre modstandsdygtig mod ukrudt og skadedyr på sandjord. Rapsen skal sås mellem 10. og 25. august. Radrensning er nødvendig på ukrudtsfyldte jorde. Raps kan tilføres en del af gødningen om efteråret og kræver at få tilført gødning meget tidlig om foråret. Gode udbytter kan opnås på 15 - 30 hk/ha.

Høst, konservering og opbevaring

Høstes på rod eller skårlægges og opsamles/tærskes med pickupbord efter 2 - 4 dages forvejring. Rapsfrø skal nedtørres til ca. 8 % vand.

NÆRINGSSTOFINDHOLD				
	Pct. af varen	Pct. af tørstof	Fordøjeligheder	
Tørstof	92,0			FK, %
Råprotein	20,2	22,0	Råprotein	70
Råfedt	40,5	44,0	Råfedt	90
Råaske	4,0	4,3	Fosfor	33
Træstof	8,4	9,1		
	Energi		Kulhydrater	
	MJ/ kg vare	MJ/kg tørstof		g/kg vare
Omsættelig energi	18,0	19,6	Stivelse	13,8
			Sukker	55,2
	Aminosyrer		Mineraler	
	g/kg vare	% af protein		g/kg vare
Lysin	11,17	5,52	Calcium	4,1
Methionin	3,81	1,88	Fosfor	6,2
Cystin	4,19	2,10	Natrium	0,9
Treonin	8,84	4,30	Klorid	4,6

Bemærkninger

Rapsfrø bør maksimalt udgøre 10 % af foderet. Frøene bør være formalede ved udfodring. Det anbefales at blande rapsfrø og korn umiddelbart inden formaling. Formaling bør ske med pladekværn/skivemølle.