

Vinterbyg



Beskrivelse af varen

Korn af Vinterbyg.

Sædskifte og dyrkning

Vinterbyg udmærker sig ved tidlig høst. Bør ikke dyrkes på let sandjord. Mere stabil på lerjorde. Vinterbyg bør sås senest ultimo september. Den kræver tidlig gødskning om foråret. På lettere jordtyper er risiko for udvintring betydelig. Bør kun undtagelsesvis medtages i sædskiftet. Udbytte ved gode forhold 35 - 50 hkg/ha.

Høst, konservering og opbevaring

Høst medio juli med mejetærsker, nedtørres til 15 % vand eller opbevares i gastæt silo.

NÆRINGSSTOFINDHOLD				
	Pct. af varen	Pct. af tørstof	Fordøjeligheder	
Tørstof	85,0			FK, %
Råprotein	10,0	11,8	Råprotein	70
Råfedt	1,9	2,2	Råfedt	52
Råaske	2,3	2,7	Fosfor	38
Træstof	4,8	5,6		
	Energi		Kulhydrater	
	MJ/kg vare	MJ/kg tørstof		g/kg vare
Omsættelig energi	11,2	13,2	Stivelse	513,0
			Sukker	33,3
	Aminosyrer		Mineraler	
	g/kg vare	% af protein		g/kg vare
Lysin	3,65	3,60	Calcium	0,7
Methionin	1,66	1,69	Fosfor	3,7
Cystin	2,43	2,40	Natrium	0,1
Treonin	3,31	3,30	Klorid	1,2

Bemærkninger

Byg indeholder glucagon, et for fjerkræ tungt fordøjeligt kulhydrat. Store mængder byg i foderblandingen giver tynd afføring hos fjerkræ. Fjerkræfoder bør max indeholde 10 % byg.