

Græs

ENSILAGE



Beskrivelse af varen

Ensilage af græs.

Sædskifte og dyrkning

Rent græs kræver meget kvælstof for at give et rimeligt udbytte og bør derfor ikke indgå med stor vægt i et sædskifte. Kan med fordel etableres på humusrige jorde. Græsser, f.eks. alm. rajgræs, kan etableres i dæksæd om foråret eller i renbestand august til primo september. Første slæt tages ved begyndende skridning for at sikre god kvalitet, og derefter hver 5. - 6. uge. Udbytte under gode forhold 6 - 7 ton tørstof/ha.

Høst, konservering og opbevaring

Skårlægges, forvejres ét døgn, finsnittes og presses i wrapballer. Ensilerings kan dog også ske i stak eller plansilo. Stakken bør være lang og smal, så der ikke opstår varme/forrådelse i forbindelse med løbende udtagning af ensilagen.

NÆRINGSSTOFINDHOLD				
	Pct. af varen	Pct. af tørstof	Fordøjeligheder	
Tørstof	32,3			FK, %
Råprotein	5,3	16,4	Råprotein	-
Råfedt	1,2	3,7	Råfedt	-
Råaske	3,4*	10,5*	Fosfor	-
Træstof	8,6*	26,6*		
	Energi		Kulhydrater	
	MJ/kg vare	MJ/kg tørstof		g/kg vare
Omsættelig energi	1,6	5,0	Stivelse	6,0
			Sukker	15,0
	Aminosyrer		Mineraler	
	g/kg vare	% af protein		g/kg vare
Lysin	2,20	4,10	Calcium	3,7
Methionin	0,70	1,30	Fosfor	1,2
Cystin	0,30	0,90	Natrium	0,6*
Treonin	2,10	4,00	Klorid	4,0*

Bemærkninger

Bør være finsnittet. Hønernes ædelyst af græsensilage er generelt begrænset.