

Kløver, mel eller grønpiller



Beskrivelse af varen

Mel eller piller af tørret kløver.

Sædskifte og dyrkning

Kløver kan etableres som udlæg om foråret eller i renbestand inden medio august. Kløverfrø må ikke sås dybere end ½-1 cm og helst i en fasttromlet jord. Udlægget er sårbart for udtørring på lettere jord og kan skades af ny generation af bladrandbiller, især hvis ærter er dæksæd. Har normalt kun behov for tilførsel af kalium. Slæt bør tages hver 5. - 6. uge. Udbytte under gode forhold 8 - 10 ton tørstof /ha.

Høst, konservering og opbevaring

Skårlægges, forvejres ét døgn, finsnittes, tørres og formales til mel og pelleteres. Opbevares i storsække eller i silo.

NÆRINGSSTOFINDHOLD				
	Pct. af varen	Pct. af tørstof	Fordøjeligheder	
Tørstof	91,0			FK, %
Råprotein	15,3	16,8	Råprotein	75
Råfedt	2,3	2,5	Råfedt	55
Råaske	7,1	7,8	Fosfor	75
Træstof	24,8	27,3		
	Energi		Kulhydrater	
	MJ/kg vare	MJ/kg tørstof		g/kg vare
Omsættelig energi	4,5	4,9	Stivelse	25,0
			Sukker	72,0
	Aminosyrer		Mineraler	
	g/kg vare	% af protein		g/kg vare
Lysin	6,1	4,0	Calcium	8,3
Methionin	2,0	1,3	Fosfor	2,3
Cystin	1,1	0,7	Natrium	0,7
Treonin	6,2	4,1	Klorid	4,4

Bemærkninger

Bør maksimalt indgå med 4 % i den samlede foderration.