

Foderkål

ENSILAGE



Beskrivelse af varen

Ensilage af foderkål.

Sædskifte og dyrkning

Foderkål kan etableres i renbestand om foråret, som efterafgrøde senest primo august for at sikre tilfredsstillende udbytte. Er marken ukrudtsfyldt, anbefales rækkesåning på 25 cm og radrensning, til afgrøden er etableret. Foderkål kan opformere kålbrot, og der bør derfor være 3 - 4 år mellem foderkål og andre typer kål samt raps og rybsafgrøde.

Høst, konservering og opbevaring

Erfaringer fra afprøvninger tilføjes senere, analyse foretages i høst 2017.

NÆRINGSSTOFINDHOLD				
	Pct. af varen	Pct. af tørstof	Fordøjeligheder	
Tørstof				FK, %
Råprotein			Råprotein	
Råfedt			Råfedt	
Råaske			Fosfor	
Træstof				
			Kulhydrater	
	MJ/kg vare			g/kg vare
Omsættelig energi			Stivelse	
			Sukker	
			Mineraler	
	g/kg vare	% af tørstof		g/kg vare
Lysin			Calcium	
Methionin			Fosfor	
Cystin			Natrium	
Treonin			Klorid	

data kommer senere

Bemærkninger

Det høje fiberindhold i produktet nedsætter fjerkræets ædelyst til produktet. Trods dets høje proteinindhold vil fodring med produktet ikke bidrage ret meget til fjerkræets næringsstofforsyning.