

AFGRÆSNING, SMÅKALVE

Overhold reglerne og få gode kvier uden problemer. Erfaringer fra 2009.



Småkvier på græs

REGLER FOR AFGRÆSNING

Kreaturer skal have adgang til græsarealer i perioden fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. Dyrene skal være på græsningsarealet minimum 6 lyse timer dagligt i denne periode. Småkalve under 4 måneder kan opstaldes indendørs. Kalve i alderen 4-6 måneder skal tilbydes adgang til afgræsning fra den 1. maj til den 1. september, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. Dyrene

må holdes op til 7 dage på stald uden notat i logbog i forbindelse med goldning, inseminering, levering til slagteri eller for at holde dyret under observation. Kalve under 6 måneder skal have mulighed for læ og skygge, når de er ude på græsarealer. Det kan være under træer, levende hegn eller i hytte eller skur. Køer, der kælver på et græsareal, skal ligeledes have mulighed for at søge læ og skygge. (Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion sept. 2009).

FOKUSOMRÅDER VEDR. SMÅKALVE PÅ GRÆS

- **Kalvefolden:** Tæt ved ejendom, hvor adgang til stald er mulig. Læhegn ved mark; hytte, der kan flyttes rundt på markerne el. lign. Græssets kvalitet: Nogle mener, græsset skal være langt, for at kalvene bedre kan tåle det, andre kommenterer det ikke. Det har evt. noget med udbindingstidspunktet at gøre. Ældre græs med mindre kløver vil måske give en lettere overgang fra stald til mark, og ikke give så brat et foderskifte. Kalvene skal gå på en god, græsdækket fold. Folderskifte bør anvendes for at forebygge parasitter.



Kalvefold til de mindste med hytte og fårehegn





God foderkrybbe til småkalve



Flytbar hytte med hjul



En indhegnet frugthave anvendes som udslusningsfold - første 3 dage

Tilvænnning til tråd og lys: kan løses med fårehegn, flere tråde eller halmballe- og bygningafgrænsning med en tråd. Fra få timer til 2 døgn tilvænnings tid. Suppleringsfodres samtidig. Herfra kan kalve så sluses ud i de rene folde.

- **Læforhold:** Hytte eller stald.
- **Foldskifte:** anbefales hver gang der lukkes nye kalve ud, samt senest d. 1.7. pga. parasitter. Ældre kalve skal flyttes videre i systemet, så gruppen og aldersspredningen ikke bliver for stor.
- **Suppleringsfoder:** Er vigtigt for at undgå, at kalvene æder for meget græs og for at sikre energitilførslen. Eksempler på suppleringsfoder: Køernes grundfoder evt. suppleret med korn eller kalveblanding, hø og mineralblanding.
- **Tilvænnning til græs:** Maj måned kan have kolde nætter, så overgangen til græs for den lille kalv kan være stor - græs er et nyt fodermiddel. Et ældre forsøg viser, at kvier taber sig i den første del af græsnings sæsonen, men tager det på igen efter midt juni. Det er derfor vigtigt at suppleringsfodre, og at kalvene evt. har adgang til stald.
- **Parasitinfektion:** Undgå permanente kalvefolde. Udslusningsfolden kan evt. bruges igen, hvis kalvene kun er der 2-3 dage. Vær opmærksom på græsmarkscoccidiose og parasitter og benyt foldskiftet til at reducere infektionens negative påvirkning af dyrene. Lungeorm skal der holdes øje med ved alle aldersgrupper af dyr - her skal som regel behandles og foldskiftes samtidig.

- **Holdstørrelse, homogene grupper:** Gruppestørrelse bør højst være 30-35 kalve. Aldersforskellen må helst ikke være større end 3 mdr. Det er nødvendigt at tage kalve under 4 måneder med i gruppen, der skal ud ved anden udbinding. Forsøg at lave homogene grupper, der kan følges ad i hele udbindingsperioden. Tag de største dyr ud af flokken, når nye sættes til.
- **Driveveje:** Undgå våde og oprådte driveveje til småkalve
- **Indbinding:** Kalve under 6 mdr. tages ind 1. sept.

YDERLIGERE INFORMATION

Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening, e-mail: kl@okologi.dk

Det europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af dette projekt.



Småkalve inde, men med dør ud i baggrunden

AFGRÆSNING - OGSÅ EN DEL AF FREMTIDENS KVÆGBRUG

Et projekt fra Dansk Kvæg, Århus Universitet og Økologisk Landsforening

