

# AFGRÆSNING, LØBEKVIER OG GOLDKØER

Overhold reglerne og få gode kvier uden problemer. Erfaringer fra 2009.



Goldkøer på græs ved ejendommen letter opsynet

## REGLER FOR AFGRÆSNING

Kreaturer skal have adgang til græsarealer i perioden fra 15. april til 1. november, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. Dyrene skal være på græsningsarealet minimum 6 lyse timer dagligt i denne periode. Småkalve under 4 måneder kan opstaldes indendørs. Kalve i alderen 4-6 måneder skal tilbydes adgang til afgræsning fra den 1. maj til den 1. september, når vejrforholdene og dyrenes fysiske kondition tillader det. Dyrene

må holdes op til 7 dage på stald uden notat i logbog i forbindelse med goldning, inseminering, levering til slagteri eller for at holde dyret under observation. Kalve under 6 måneder skal have mulighed for læ og skygge, når de er ude på græsarealer. Det kan være under træer, levende hegn eller i hytte eller skur. Køer, der kælder på et græsareal, skal ligeledes have mulighed for at søge læ og skygge. (Vejledning om økologisk jordbrugsproduktion sept. 2009).



Foderhæk til goldkøer med særlig goldkoblanding



Løbekvier på stald til drægtighedsundersøgelse

## LØBEKVIER FOKUSOMRÅDE: VELLYKKET IKÆLVNING UDEN LÆNGERE STALD- OPHOLD FOR KVIERNE

### Løsningsforslag:

- Nærhedsprincippet: Løbekvierne går i en lille mark nær ejendommen, hvor opsyn og dermed brunstobservation er nemt.
- Inseminering/egen tyr.
- Sammen med køer, hvor de går ud og ind sammen med dem.
- Aktivitetsmåler - hea-timer - kan anvendes ved overgang fra bygning til mark, hvor føleren kan opsættes.





Kreaturvogn til transport af kvier hjem til inseminering eller goldkøer til og fra en mark



Driveveje skal holdes i orden, når der er meget trafik

- Ud/ ind sammen med goldkøer, hvor de kan æde malkekøernes foderrester
- Ud/ ind i egen gruppe evt. modsat køer, så de kan æde foderrester
- Fanggitter på marken: Der kan laves foderbord eller hæk med fanggitter. En flytbar fangefold kan anvendes. Kvierne lokkes med lidt korn/ mineralblanding eller andet
- Hjemtagning med vogn
- Drivgange, der kan holde hele sommeren

## GOLDKØER FOKUSOMRÅDER VED GOLDNING OG KÆLVNING:

**Ved goldning:** Det er sjældent en udfordring at golde dyrene på en uge, men der kan være problemer med enkelte dyr (3-5 %).

### Løsningsforslag:

- Systematik ved afgoldning - start afgoldning en fast ugedag. Tag foderet fra køerne, undtagen halm. Malk 1 til 2 dage mere, efter 2-3 dage tildeles lidt ensilage. Hold en meget restriktiv fodring i afgoldningsugen.
- Hold godt øje med yveret i denne periode.
- Græssets kvalitet og tilbud skal være reduceret, så de får restriktiv fodring.



Fold til goldkøer og kælvning nær stalden



Vandkar



Mineraltønde til goldkøer

### Ved kælvning:

Indtagning efter forventet kælvningsdato, kan give problemer med de 7 dage, så prøv et af nedenstående forslag:

### Løsningsforslag:

- Ud/ ind med goldkogruppen. Luk fra, når de viser tegn på kælvning.
- Kælvning på mark i sommerperioden
- Kælvningsafdeling med nem adgang til marken

### Andet:

- For at undgå mælkefeber er det nødvendigt at lave restriktiv fodring, regulere græsarealet, suppleringsfodre og huske goldkomineralblanding.
- Driveveje, der kan holde hele sommeren.

## YDERLIGERE INFORMATION

Kirstine Lauridsen, Økologisk Landsforening, e-mail: [kl@okologi.dk](mailto:kl@okologi.dk)

*Det europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af dette projekt.*