

Samgræsning med malkekøer

Får, heste, eller geder kan med fordel samgræsse med malkekvæg og derved give bedre græs arealer.

Alle dyrearter har forskellige præferencer og afgræsningsadfærd. Ved at lade flere dyrearter afgræsse samme areal får det enkelte dyr bedre græskvalitet, og der kan hentes flere FE/Ha. Derudover kan man som landmand spare afpudsning af græsmarkerne, og sænke parasittrykket.

Får som ukrudtsryddere

Får æder gerne skræpperne i græsmarken og efterlader det gode græs til køerne.

Fordele

- Afpudsning af græsmarken
- Mindsker parasitbyrden
- Flere FE/ha
- Får er lette dyr der ikke beskadiger marken
- Får kan gå ude hele året

Udfordringer

- Får kræver flere trådet hegn
- Fårene må ikke have adgang til kvæg mineraler

Fårene bør komme tidligt på arealet, og trimme marken før kvæget

CASE

Jørgen Sønderby har 160 køer og ca. 40 Gotlandske pelsfår. Fårene plejer kvægets græsmarker fra oktober til april, og holder derved græsmarkerne fri for ukrudt, så græsset får optimale vækstbetingelser.

Nethegnet der bruges til at holde fårene inde, fungerer fint på folde hvor køerne kælder, og holder derved også kalvene inde.



Bedre græs til kvierne

Fersk eng med krav om afgræsning kan være et oplagt sted at afgræsse med kvier.

Samgræsning med flere forskellige dyregrupper, f.eks. hest, får og ged giver bedre tilgængeligt græs til kvæget. Dette gøres nemmest ved entreprenør afgræsning. Derved har kvægbrugeren kun ansvaret for sine egne dyr.

Fordele

- Velplejet eng uden mekanisk afpudsning
- Bedre tilvækst for kvierne ved bedre græs
- Nedsat parasitbyrde

Udfordringer

- Kort sæson for kvæget på arealet
- Brug for en buffer mark

Eksempel på samgræsning med forskellige dyregrupper

- Tidlig udbinding- maj: får
- Maj-august :kvier
- August- indbinding: geder eller heste, alt efter arealets tilstand

Dermed er arealet plejet og klar til at give bedst mulige udbytter næste år.

Kalve og de små drøvtyggere kan dele hegn

Har man små drøvtyggere på sin bedrift kan deres vinterfold være en rigtig god starter fold for små kalve. Det fornødne hegn til får og geder vil nemt kunne holde kalve inde, og de voksne drøvtyggere vil fortynde parasitbyrden på arealet over vinteren. Derved udsættes kalvene for mindre smittetryk.

Fordele

- Kalvefolde vil kunne bruges hele året uden at smittepresset opformeres
- Græsmarken vil blive afpudset

Udfordringer

- Der skal være andre folde til kalvene efter 1. juli
- Udbinding af flere kalvehold over sommeren giver udfordringer med foldskifte

CASE

Laust Krejbjerg har 155 malkekøer og 44 geder. Hans geder græsser et permanent græsareal tæt på gården hele vinteren. Ca. i april kommer gederne på arealer hvor de yder naturpleje i form af afgræsning af bjørneklo.

Når gederne er væk fra arealet bruges det til at lære kalvene at være på græs, før de kommer på større arealer længere væk fra gården.

