


Godt vinterrapsudbytte kommer ikke tilfældigt

Her er der gode muligheder for en vellykket rapsmark

Resultater fra projektet **Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps** viser at:

- Marken er klar efter sidste afgrøde senest 5. august.
- Rettidig såning (10-20. august – i lune egne en uge senere) – Vinterraps kvitterer voldsomt for rettidig såning – koster i gns. 36 kg frø pr ha/dag det udsættes – få naboen eller maskinstationen til at så, hvis du er i gang med at høste. Der er mange penge at høste til næste år hvis du får rapsen rettidigt i jorden.

Eks. 10 ha x 10 dage x 36 kg/dag x 6,5 kr./kg = 23.400 kr.



- Bedre jord – gerne lerjord.
- Godt såbed – Pas på udtørring og for fin pulverisering ved tør jord.
- Rækkedyrkning på 25-50 cm giver bedste udbytte ifølge svenske forsøg og data fra nyt projekt i DK. Dog kan man så på 12,5 cm hvis man har rene marker.
- Lavt plantetal og rækkedyrkning er med til at give stærke og kraftige planter
- Gerne ren mark – helst ikke med agerkål, kamille, fuglegræs, hyrdetaske, spergel og spildkorn i for store mængder. Vigtigt at lægge ukrudtsstrategien før såning.
- Når rapsen sås tidligt eller der er nedmuldet halm, bør rapsen tilføres 40-60 kg N i efteråret. Kvælstoffen kan komme fra eftervirkning eller tilføres som gødning. Nyeste forsøg viser at det ikke påvirker den totale mængde N til marken.
- Vigtigt med svovl til afgrøden - 30-40 kg/ha.
- Der skal være nok kvælstof på ejendommen, til at rapsen kan få sit N-behov dækket
- Hold styr på agersneglene

Her bør du overveje at lade være:

- Du kan ikke så rettidigt
- Der er højt ukrudtstryk i den valgte mark – især af agerkål, kamille, fuglegræs, hyrdetaske, amsinckia, samt spildkorn.
- Lettere jord
- Svært ved at nå rettidig ukrudtsbekæmpelse med radrenseren
- For lidt gødning på ejendommen, til at fuldgøde rapsen
- Dårlig forfrugt, som ikke kan høstes eller pløjes ned i starten af august.
- Frøgræs og bælgplanter, gulsennep og kål som forfrugt. Frøgræs tager N, og bælgplanter inden for 2 år kan give kålbrok og knoldbægersvamp.
- Mange rapsmarker i området, da det giver større skadedyrstryk



Men husk – at vinterraps er en mere risikobetonet afgrøde end f.eks. vårbyg, og enkelte år kan det gå galt pga. vejret eller skadedyrsangreb. Hvert 7 år i gns. kommer der store angreb af rapsjordlopper.

Markdemoen afholdes i projektet Dyrkningssikkerhed og strategi i økologisk vinterraps, som er støttet af:

Udarbejdet af Jesper Fog-Petersen 25.4.2018